



ऑपरेटरों के लिए मार्गदर्शन: इयर पियर्सिंग

स्वास्थ्य संबंधी चिंता

सूक्ष्मजीव पियर्सिंग क्षेत्र पर त्वचा के नीचे के ऊतकों में घुसपैठ कर सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इयर पियर्सिंगके लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण/औज़ार रक्त या

बॉडी फ्लुइड्स (शरीर के द्रव्य तत्वों) से दूषित हो सकते हैं, जो रक्त-जनित बीमारियों जैसे Hepatitis B, Hepatitis C और HIV को साथ लिए हुए हो सकते हैं। **आपको संक्रमण के ट्रांसमिशन के लिए औज़ारों पर रक्त या बॉडी फ्लुइड्स को देखने की ज़रूरत नहीं है।**

वैधानिक आवश्यकताएँ

व्यक्तिगत सेवा सेटिंग्स (Personal Service Settings) (PSS) को **ऑंटारियो विनियमन 136/18: व्यक्तिगत सेवा सेटिंग (Ontario Regulation 136/18: Personal Service Settings) के अनुपालन में परिचालन करना आवश्यक है।**

PSS के ऑपरेटरों और कर्मचारियों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण अभ्यासों के बारे में अधिक जानने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ऑंटारियो से **व्यक्तिगत सेवा सेटिंग्स में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गाइड** की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो PSS में संक्रमण के संचारण के जोखिम को कम करते हैं।

सूचित सहमत

सेवा प्रदान करने से पहले, ऑपरेटरों को ग्राहकों को प्रक्रिया की व्याख्या और प्रक्रिया से जुड़े किसी भी जोखिम के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी। सेवा प्रदाता को दस्तावेज के रूप में इसका एक रिकॉर्ड रखना होगा कि जानकारी प्रदान की गई थी।

ऑपरेटर स्वास्थ्य और सुरक्षा

- सेवा के दौरान दस्ताने पहनें।
- दस्ताने को पहनने से पहले और उतारने के बाद हाथ धोएँ।
- अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाएँ।
- सेवा के दौरान खाना, पीना या धूम्रपान न करें।
- एसडब्ल्यूपीएच (SWPH) अनुशंसा करता है कि सभी ऑपरेटरों को Hepatitis B का टीका लगाया जाए।

त्वचा को लेकर तैयार

- जिन ग्राहकों को काम किए जा रहे क्षेत्र के 6 इंच के भीतर चोट, घाव, चकत्ते या त्वचा संक्रमण है, उन्हें सेवा प्रदान न करें।
- यदि त्वचा पर सिंगल-यूज़ (केवल एक बार उपयोज्य) मार्कर या टूथपिक से निशान लगाया जा रहा है, तो त्वचा पर निशान लगाएं और जब निशान सूख जाए, तो त्वचा पर एंटीसेप्टिक लगाएं।
- प्रक्रिया से पहले, त्वचा पर एंटीसेप्टिक लगाएं। त्वचा एंटीसेप्टिक्स में शामिल हैं, जो कि केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:
 - पोवीडोन-आयोडीन सॉल्यूशन (घोल)
 - आइसोप्रोपाइल एल्कोहल (50 – 91%)
 - इथाइल एल्कोहल (60 – 95%)
- यदि लागू हो, तो त्वचा एंटीसेप्टिक लगाने के बाद एक प्रासंगिक स्थानीय एनेस्थेटिक का उपयोग किया जा सकता है।

उपचार के बाद त्वचा की देखभाल

- छेदे हुए क्षेत्र को किसी स्वीकृत त्वचा एंटीसेप्टिक से पोंछें।
- यदि किसी मरहम या ल्युब्रिकेंट (चिकने पदार्थ) का उपयोग किया जाता है, तो इसे इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए कि संदूषण को रोका जा सके, यानी इसे दो बार ना डुबोएँ।
- ग्राहकों को मौखिक और लिखित देखभाल संबंधी निर्देश दिए जाने चाहिए जिनमें निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:
 - क्षेत्र को छूने से पहले तुरंत हाथ साफ कर
 - संशोधित क्षेत्र को, जहां लागू हो, घावों को ढकने के उद्देश्य से सिंगल-यूज़ ड्रेसिंग से ढकें
 - स्थल का अपेक्षित उपचार समय
 - संभावित जटिलताओं और उनके संकेतों और लक्षणों का विवरण
 - हल्का लाल होने, दर्द या सूजन से निपटने के बारे में सलाह
 - यदि प्रक्रिया के बाद संक्रमण के कोई लक्षण विकसित हों, तो 24 घंटे के भीतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता से परामर्श करने के लिए सलाह दें

औज़ार और उपकरण

- इयर पियर्सिंग गन्स/उपकरणों का उपयोग कान के लोब (केवल मांसल भाग) को छोड़कर शरीर के किसी अन्य भाग पर नहीं किया जाना चाहिए।
- इयर पियर्सिंग गन्स/उपकरण बिना विसंक्रमित, सिंगल-यूज़ डिस्पोजेबल (उपयोग पश्चात् फेंकने वाले) प्लास्टिक कारतूस जो कान के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें प्रत्येक ग्राहक के उपयोग के बीच साफ और स्टेरेलाइज़ (विसंक्रमित) किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए [स्टेरेलाइज़ेशन फैक्ट शीट](#) देखें।
- डिस्पोजेबल एडाप्टर या कारतूस के बिना इयर पियर्सिंग गन्स/उपकरणों की अनुशंसा नहीं की जाती है।

सफाई और कीटाणुशोधन

सफाई

- सभी औज़ार, उपकरण और सतहें जिन्हें सफाई और कीटाणुशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें **ज़रूरी रूप से** पहले पूरी तरह से अलगा दिया जाना चाहिए। फिर वस्तुओं को साबुन या डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में साफ करना चाहिए।
- उपयोग के बाद लिनेन को अवश्य धोना चाहिए और इसकी पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।
- दीवारों, फर्शों, छतों और सतहों की नियमित सफाई की जानी चाहिए।

कीटाणुशोधन

कीटाणुशोधन से जुड़े सारे काम प्रतिदिन नए सिरे से या निर्माता के निर्देशों के अनुसार किए जाने चाहिए। सभी कीटाणुशोधकों के पास हेल्थ कनाडा द्वारा जारी एक दवा पहचान संख्या (drug identification number (DIN)) या एक प्राकृतिक उत्पाद संख्या (natural product number (NPN)) होनी चाहिए।

स्तर	कब इस्तेमाल करें	उदाहरण
निम्न स्तर	उपकरण और औज़ार या आइटम जो सीधे ग्राहक से संपर्क नहीं करते हैं या केवल बालों या इंटैक्ट (कार्य-स्थल से बाहर की) त्वचा से संपर्क करते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> • सर्विस ट्रे • पर्यावरणीय सतह • उपकरण कंटेनर
मध्यम स्तर	उपकरण, औज़ार या आइटम जिनका उद्देश्य केवल इंटैक्ट त्वचा से संपर्क करना है, लेकिन जो गलती से गैर-इंटैक्ट त्वचा या म्यूकस मेंबरेंस (श्लेष्म झिल्ली) के संपर्क में आ सकते हैं या त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> • कैलिपर्स
उच्च स्तर	कोई भी सतह, उपकरण या औज़ार जो रक्त के संपर्क में आ सकते हैं।	उपलब्ध नहीं

स्वीकृत कीटाणुशोधकों और संपर्क समय की जानकारी के लिए [कीटाणुशोधन चार्ट](#) देखें।

वेस्ट डिस्पोज़ल (अपशिष्ट निपटान)

- जिस वेस्ट पर रक्त और/या बॉडी फ्लुइड लगे हों उसे लीक-प्रूफ बैग में फेंकें।
- उपयोग के बाद सिंगल-यूज़ उपकरणों और औजारों को बाहर फेंक दें।
- सिंगल-यूज़ शार्प को एक स्वीकृत शार्प कंटेनर में फेंक दिया जाना चाहिए जो कैनडा स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन के मानकों को पूरा करता हो।
- जब सामग्री कंटेनर पर फिल लाइन मार्क तक पहुंच जाए या तीन-चौथाई भर जाए तो शार्प कंटेनरों को सील कर दिया और बदल दिया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड रखना

ग्राहकों के रिकॉर्ड

- व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने से पहले, PSS ऑपरेटर या वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत सेवा प्रदान करेगा, उसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी होगी और रिकॉर्ड करनी होगी:
 - ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी
 - सेवा प्रदाता का नाम
 - रिकॉर्ड करें कि ग्राहक को कौन सी सेवा प्राप्त हुई
 - रिकॉर्ड करें कि ग्राहक को प्रक्रिया और जोखिमों का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था
 - प्रक्रिया की तिथियाँ
 - प्री-पैकेज्ड विसंक्रमित उपकरण के लॉट नंबर और एक्सपाइरी डेट (समाप्ति तिथि)

उच्च स्तर के कीटाणुशोधक

- यदि उच्च स्तर कीटाणुशोधकों का उपयोग किया जाता है, तो PSS को **कीटाणुशोधन रिकॉर्ड लॉग** में उल्लिखित जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

आकस्मिक रक्त या बॉडी फ्लुइड से संपर्क

- PSS के लिए सभी आकस्मिक रक्त या बॉडी फ्लुइड संपर्क को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। रिकॉर्ड्स में **आकस्मिक ब्लड एक्सपोज़र लॉग** में उल्लिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए।

रिकॉर्ड रखवाली

- रिकॉर्ड को एक साल तक ऑन-साइट रखा जाना चाहिए। पहले साल के बाद, रिकॉर्ड को कम से कम दो सालों तक सुरक्षित जगह पर संभाल के रखा जाना चाहिए और आसानी से उपलब्ध रखा जाना चाहिए।

सवाल?

यदि आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया अपने क्षेत्र के Public Health Inspector (सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक) से 1-800-922-0096 पर संपर्क करें।

