



ऑपरेटरों के लिए मार्गदर्शन: मेकअप और फेशियल

स्वास्थ्य संबंधी चिंता

मेकअप लगाने और फेशियल करने से गैर-इंटैक्ट (कार्य-स्थल से बाहर की) त्वचा या म्यूकस मेंबरेंस (श्लेष्म झिल्ली) के माध्यम से संक्रमण हो सकता है। इससे खुली जगह पर रोगजनक सूक्ष्मजीवों के प्रवेश की अनुमति मिल सकती है। संक्रमण बैक्टेरियल, फंगल या वायरल हो सकता है। **आपको संक्रमण के संचारण के लिए औज़ारों पर रक्त या बॉडी फ्लुइड्स (शरीर के द्रव्य तत्वों) को देखने की ज़रूरत नहीं है।**

वैधानिक आवश्यकताएँ

व्यक्तिगत सेवा सेटिंग्स (Personal Service Settings) (PSS) को **ऑंटारियो विनियमन 136/18: व्यक्तिगत सेवा सेटिंग (Ontario Regulation 136/18: Personal Service Settings) के अनुपालन में परिचालन करना आवश्यक है।**

PSS के ऑपरेटरों और कर्मचारियों को संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण अभ्यासों के बारे में अधिक जानने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य ऑंटारियो से **व्यक्तिगत सेवा सेटिंग्स में संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गाइड** की समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो PSS में संक्रमण के संचारण के जोखिम को कम करते हैं।

ऑपरेटर स्वास्थ्य और सुरक्षा

- सेवाएँ प्रदान करने से पहले हाथों को धोएँ।
- सेवा के दौरान खाना, पीना या धूम्रपान न करें।
- अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाएँ।

त्वचा को लेकर तैयार

- जिन ग्राहकों को काम किए जा रहे क्षेत्र के 6 इंच के भीतर चोट, घाव, चकत्ते या दृश्यमान त्वचा संक्रमण है, उन्हें सेवा प्रदान न करें।
- सेवा आरंभ करने से पहले ग्राहक की त्वचा साफ होनी चाहिए।

औज़ार और उपकरण

- डबल-डिपिंग (एक ही उपयोग के दौरान (साफ किए बिना) दो बार दवा में डुबोने), यानी, ग्राहक को एप्लिकेटर से छूना और फिर अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए उसी एप्लिकेटर का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। निम्नलिखित विधियों की अनुमति है:
 - ऐसे कंटेनरों का उपयोग करें जहां उत्पाद को निचोड़ा या पंप किया जा सके।
 - उत्पाद प्राप्त करते समय एप्लिकेटर का उपयोग करें।
 - सिंगल यूज़ (केवल एक बार उपयोक्त) कंटेनर्स का इस्तेमाल करें।
- प्रत्येक उपयोग के बाद फेशियल स्टीमर रिज़र्वायर को खाली कर दें। रिज़र्वायर में कभी भी पानी नहीं छोड़ना चाहिए।
- प्रत्येक ग्राहक के बाद आंख और लिप लाइनर पेंसिल को शार्प करें। शार्पनर को रोजाना साफ और डिसइन्फेक्ट (कीटाणुरहित) करें।
- अंतर्वर्धित बालों को उजागर करने के लिए विसंक्रमित लैंसेट/नीडल्स का उपयोग करें, चिमटी का नहीं। एक बार बाल उजागर हो जाने पर बालों को खींचने के लिए चिमटी का उपयोग किया जा सकता है।
- रीयूज़ेबल मेकअप ब्रशों को एक उपयोग से दूसरे उपयोग के बीच साफ और डिसइन्फेक्ट किया जाना चाहिए। ब्रशों को उचित स्तर के कीटाणुशोधक में डुबाना चाहिए।
- ब्यूटी स्पंज केवल एक बार ही उपयोग किए जा सकते हैं क्योंकि इन्हें ठीक से साफ और सैनिटाइज़ नहीं किया जा सकता है।
- उपयोग में न होने पर सभी रीयूज़ेबल फेशियल और मेकअप उपकरणों को एक साफ, ढके हुए, गैर-अवशोषक कंटेनर में संग्रहित किया जाना चाहिए।

सफाई और कीटाणुशोधन

सफाई

- सभी औज़ार, उपकरण और सतहें जिन्हें सफाई और कीटाणुशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें **ज़रूरी रूप से** पहले पूरी तरह से अलग दिया जाना चाहिए। फिर वस्तुओं को साबुन या डिटर्जेंट के साथ गर्म पानी में साफ करना चाहिए।
- प्रत्येक उपयोग के बाद सभी लिनेन को अवश्य धोना चाहिए और इसकी पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए।
- दीवारों, फर्शों, छतों और सतहों की नियमित सफाई की जानी चाहिए।

कीटाणुशोधन

कीटाणुशोधन से जुड़े सारे काम प्रतिदिन नए सिरे से या निर्माता के निर्देशों के अनुसार किए जाने चाहिए। सभी कीटाणुशोधकों के पास हेल्थ कनाडा द्वारा जारी एक दवा पहचान संख्या (drug identification number (DIN)) या एक प्राकृतिक उत्पाद संख्या (natural product number (NPN)) होनी चाहिए।

स्तर	कब इस्तेमाल करें	उदाहरण
निम्न स्तर	उपकरण और औज़ार या आइटम जो सीधे ग्राहक से संपर्क नहीं करते हैं या केवल बालों या इंटैक्ट त्वचा से संपर्क करते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> उच्च स्पर्श सतहें उदाहरणार्थ कुर्सियाँ, मेज, सिंक फेशियल स्टीमर मशीन और रिज़र्वायर
मध्यम स्तर	औजार, उपकरण, या आइटम जिन्हें उद्देश्य केवल इंटैक्ट त्वचा से संपर्क करना है, लेकिन जो गलती से गैर-इंटैक्ट त्वचा या म्यूकस मेंबरेंस (श्लेष्म झिल्ली) के संपर्क में आ सकते हैं या त्वचा में प्रवेश कर सकते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> फेशियल के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जो इंटैक्ट त्वचा से संपर्क करते हैं, जैसे मेकअप ब्रश नकली नेत्र-रोम लगाने के लिए चिमटी
उच्च स्तर	कोई भी सतह, उपकरण या औज़ार जो रक्त के संपर्क में आ सकते हैं।	<ul style="list-style-type: none"> फेशियल के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण जो गैर-इंटैक्ट त्वचा से संपर्क करते हैं (उदाहरण के लिए, मुँहासों का उपचार, माइक्रोडर्माब्रेशन) माइक्रोब्लेड हैंडल माइक्रोनीडल रोलर हैंडल

स्वीकृत कीटाणुशोधकों और संपर्क समय की जानकारी के लिए [कीटाणुशोधन चार्ट](#) देखें।

वेस्ट डिस्पोज़ल (अपशिष्ट निपटान)

- जिस वेस्ट पर रक्त और/या बॉडी फ्लुइड लगे हों उसे लीक-प्रूफ बैग में फेंकें।
- उपयोग के बाद सिंगल-यूज़ उपकरणों और औजारों को बाहर फेंक दें। सिंगल-यूज़ शार्प को एक स्वीकृत शार्प कंटेनर में फेंक दिया जाना चाहिए जो कैनडा स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन के मानकों को पूरा करता हो।
- जब सामग्री कंटेनर पर फिल लाइन मार्क तक पहुंच जाए या तीन-चौथाई भर जाए तो शार्प कंटेनरों को सील कर दिया और बदल दिया जाना चाहिए।

रिकॉर्ड रखना

ग्राहकों के रिकॉर्ड

- व्यक्तिगत सेवा प्रदान करने से पहले, PSS ऑपरेटर को ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसे रिकॉर्ड करना होगा।
- यदि त्वचा आदि के भीतर सूई आदि घुसाने की कोई सेवा प्रदान की जा रही है, जैसे कि माइक्रोनीडलिंग, तो PSS ऑपरेटर या वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत सेवा प्रदान करेगा, उसे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करनी होगी और रिकॉर्ड करनी होगी:
 - ग्राहक का नाम और संपर्क जानकारी
 - सेवा प्रदाता का नाम
 - रिकॉर्ड करें कि ग्राहक को कौन सी सेवा प्राप्त हुई
 - रिकॉर्ड करें कि ग्राहक को प्रक्रिया और जोखिमों का स्पष्टीकरण प्रदान किया गया था
 - प्रक्रिया की तिथियाँ
 - प्री-पैकेज्ड विसंक्रमित औजार के लॉट नंबर और एक्सपाइरी डेट (समाप्ति तिथि)

उच्च स्तर के कीटाणुशोधक

- यदि उच्च स्तर कीटाणुशोधकों का उपयोग किया जाता है, तो PSS को **कीटाणुशोधन रिकॉर्ड लॉग** में उल्लिखित जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

आकस्मिक रक्त या बॉडी फ्लुइड संपर्क

- PSS के लिए सभी आकस्मिक रक्त या बॉडी फ्लुइड संपर्क को रिकॉर्ड करना आवश्यक है। रिकॉर्ड्स में **आकस्मिक ब्लड एक्सपोज़र लॉग** में उल्लिखित जानकारी शामिल होनी चाहिए।

रिकॉर्ड रखवाली

- रिकॉर्ड को एक साल तक ऑन-साइट रखा जाना चाहिए। पहले साल के बाद, रिकॉर्ड को कम से कम दो सालों तक सुरक्षित जगह पर संभाल के रखा जाना चाहिए और आसानी से उपलब्ध रखा जाना चाहिए।

सवाल?

यदि आपके कोई सवाल हैं, तो कृपया अपने क्षेत्र के Public Health Inspector (सार्वजनिक स्वास्थ्य निरीक्षक) से 1-800-922-0096 पर संपर्क करें।